

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-3-74 722569

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 86-22-75)

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

ABONNEMENT ANNUEL

30,00 Francs

28 Février 1974 - n° 4

TAVELURE DU POIRIER

La végétation est passablement freinée par le temps frais actuel et nous n'avons pas encore noté de projections d'ascospores, malgré l'arrivée à maturité de certaines périphères.

Mependant, il est utile, comme nous le précisons dans notre bulletin n° 3 du 14 février, d'exécuter un premier traitement fongicide sur les variétés de poiriers atteignant le stade sensible C 3, et de renouveler le traitement conseillé dans notre précédent bulletin sur les variétés ayant dépassé le stade D.

TAVELURE DU POMMIER

Il est encore trop tôt pour envisager un traitement contre la Tavelure du pommier.

PUCERONS DU FRAISIER

Dans l'ensemble, les populations de pucerons sur fraisiers sont encore faibles, en particulier dans les cultures de plein champ.

Dans les cultures sous abris, surveiller l'évolution des populations et intervenir avec un insecticide lorsqu'on observe plus d'une dizaine de pucerons par plant.

On utilisera alors au choix l'un des produits suivants :

- Diméthoate : (Asthoate, Ceryl, Daphène, Diostop, Diméthox, Perfektion, Rogor, Roxion, Vitex...).
- Formothion : (Anthio).
- Mévinphos : (Phosdrin, Phosdratox, Phosfène, Phoslit, Vinyphos...).
- Phosalone : (Azofène, Dynalone, Zolone).

aux doses recommandées par les fabricants.

.../...

P62

EXCORIOSE DE LA VIGNE

Dans les vignes très atteintes, nous rappelons le grand intérêt du traitement de prédébourement à l'Arsénite de Soude, à la dose de 625 g de M.A./hl (2,5 litres des produits commerciaux ordinaires, et 1,250 litre des produits commerciaux dits "doubles").

La pulvérisation sera effectuée par beau temps sur des sarments bien res-suyés une dizaine de jours après la taille et en tout état de cause avant le débourement.

Elle sera appliquée avec soin, à la lance, de façon à mouiller abondamment la base des sarments (350 à 500 l/ha).

PUCERON VERT DU PECHER

Il n'est pas nécessaire d'envisager, à l'heure actuelle, de traitement contre le puceron vert du pêcher. Aucune fondatrice n'a encore été décelée dans les vergers.

Ce bulletin est le dernier que recevront les personnes non réabonnées en 1974.

L'Ingénieur d'Agronomie
Chargé des Avertissements Agricoles

J. TOUZEAU

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"AQUITAINE"

M. LARGE

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant : L. BOUYX